



נشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) 1986

אקנתרים

מחלו

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

إقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

التركيب:

المادة الفعالة: Erythromycin 2%

المواد غير الفعالة:

Alcohol, propylene glycol, oleyl alcohol, perfume essence.

الفصيلة العلاجية:

مضاد حيوي من فصيلة البنية الضخمة (المكروبيد).

تأثيرات الدواء الطبية:

يعتبر هذا الدواء "مضاد حيوي يستعمل للعلاج الموضعي بـ "حب الشباب" (acne vulgaris) وخاصة الإلتهابي المترافق ببثور وتقيحات (papular pustular acne).

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز لك إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز إستعمال هذا الدواء لدى الأطفال دون عمر 12 سنة.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل و/أو في فترة الرضاعة.

تحذيرات:

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

لا يجوز إستعمال اكنتريم قريباً للعين، في الأنف، في الفم أو في الأغشية المخاطية. من المفضل أثناء العلاج بالدواء الإمتناع عن إستعمال مواد مجففة للجلد.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواء إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

عليك ترك فاصل زمني قدره ساعة على الأقل بين دهن هذا الدواء ودهن أدوية أخرى أو مستحضرات أخرى مثل: المستحضرات التجميلية، العطور، الصوابين، معجون الحلاقة وما شابه.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل: جفاف الجلد، تهيج الجلد، تقشر خفيف للجلد والشعور بالسخونة في مكان العلاج.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

طفح أو إلتهاب موضعي (لم يكونا قبل إستعمال المستحضر): (أعراض نادرة): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

المقارير الدوائية:

يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط.

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו – 1986

אקנתרים

תמיסה

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

הרכב:

החומר הפעיל: Erythromycin 2%

החומרים הבלתי פעילים:

Alcohol, propylene glycol, oleyl alcohol, perfume essence.

קבוצה תרופוית:

אנטיביוטיקה ממשפחת המאקרוליידים.

פעילות רפואית:

טיפול אנטיביוטי מקומי ב"פצעי בגרות" (acne vulgaris) ובמיוחד פצעי בגרות דלקתיים עם חטטים ומגליות (papular pustular acne).

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון ו/או מיניקה.

אזהרות:

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני השימוש בתרופה.

אין להשתמש באקנתרים סמוך לעין, באף, בפה או בקרומים ריריים. בעת הטיפול באקנתרים רצוי להימנע משימוש בחומרים המייבשים את העור.

תגובות בין תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות. עליך להפריד פרק זמן של שעה לפחות בין מריחת תרופה זו למריחת תרופות אחרות או תכשירים אחרים כגון: תכשירים קוסמטיים, בשמים, סבונים, קרם לגילוח וכד'.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: יובש בעור, גירוי בעור, קילוף קל של העור והרגשת חום במקום הטיפול.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

פריחה או דלקת מקומית (שלא היו קיימות לפני השימוש בתכשיר): (נדירות) הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא. בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון:

מינון לפי הוראות הרופא בלבד.

מינון מקובל בהעדף הוראה אחרת מהרופא:
לפתיחה ראשונה של הבקבוק יש ללחוץ בחוזקה באצבע נקיה על מרכז הספוגית.

למבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: לאחר ניקוי העור מרח/י אקנתרים על כל אזורי העור הנגועים פעמיים ביום: בוקר וערב.

במקרים של התפתחות יובש יתר באזורים המטופלים ישקול הרופא הפחתת תדירות הטיפול לפעם ביום.

יש למרוח אקנתרים לפי הוראות הרופא ולהשלים את כל הטיפול התרופתי.

רצוי להימנע משטיפת האזורים הנגועים לעיתים קרובות מדי כדי למנוע יובש העור והחמרת המצב.

המנע/י מטיפול באקנתרים ליד אש גלויה או בעת העישון. אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12 שנים. אם לא חל שיפור במצבך תוך חודש ימים יש לפנות לרופא שנית.

שימו לב:

לא בלבד! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

איכיד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום נפרד מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק.

אל תיתנ/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

יש לשמור במקום קריר, מתחת ל- 25°C.

זהירות! חומר דליק, הרחוק/י מאש!

יש לסגור את הבקבוק היטב למניעת התנדפות החומר. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברקוח שטיפק לך את התרופה.

מס' רישום התרופה: 035.38.25621.00

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי.



107058010



