



נشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة  
(مستحضرات) 1986

## كابوتريم 0.5 ملغ

### أقراص

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

أقراص/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

التركيبة:

كل قرص يحتوي على:

Cabergoline 0.5 mg

المواد غير الفعالة:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, citric acid (anhydrous), magnesium stearate

الفصيلة العلاجية:

من مقدرات مستقبلات الدوبامين.

تأثيرات الدواء الطبية:

مُثبط وكابح لإنتاج البرولاكتين.

يستعمل لتثبيط وإيقاف إنتاج الحليب ولمعالجة إضطرابات فرط البرولاكتين في الدم.

متى لا يجوز لك إستعمال الدواء؟

لا تستعجلي هذا الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أو الرضاعة (إلا إذا كان الدواء مخصص لوقف الإرضاع). لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته أو للقلويدات من فصيلة الإبرغوت (Ergot).

لا يجوز الإستعمال إذا كنت تعاني من ضغط الدم العالي غير المسيطر عليه.

لا يجوز إستعمال المستحضر لدى أشخاص يعانون من سابقة لتليف (Fibrosis) في الرئتين، في غلاف القلب (Pericardium) و/أو في جوف البطن الخلفي (Retroperitoneum).

لا يجوز إستعمال المستحضر لدى أشخاص يعانون من إصابة بنوبية في صمامات القلب.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً في الحالات التالية:

إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: الجهاز التنفسي (كالربو) والقلب و/أو الاوعية الدموية، الكبد، الكلية/المسالك البولية، الجهاز الهضمي (كالقرحة)، متلازمة رينو، سابقة لإضطرابات نفسية أو ذهانية أو لدى المرضى المعالجون بالمضادات النفسية الذهانية.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من يقظتك ويمكنه أيضاً أن يسبب النوم المفاجيء، لذا يجب إتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل ماكنات خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب البقظة.

تحذيرات:

قبل تناول الدواء، وإذا تأخر الطمث لأكثر من ٣ أيام، يجب إجراء الفحوص الطبية لنفي وجود الحمل.

أثناء فترة إستعمال هذا الدواء، يجب إستعمال وسائل غير هورمونية لمنع الحمل. أما في حالة الحمل، يجب التوقف حالاً عن تناول الدواء.

يجب الإمتناع عن الحمل شهراً على الأقل منذ الإنتهاء من العلاج بهذا الدواء.

في حالات معينة فإن العلاج المطول بكابرجولين قد يسبب تليفاً وحالات التهابية للرئتين، غشاء القلب وجوف البطن الخلفي وكذلك لإصابة في صمامات القلب. في حالات معينة عند التوقف عن العلاج بكابرجولين يطرأ تحسن على حالة صمامات القلب.

للمرضى الذين يتناولون كابرجولين والذين يشعرون بإضطرابات أو صعوبة في التنفس، من الموصى به مراجعة الطبيب كي يدرس إجراء صورة للصدر بأشعة رنتجن، كذلك فحص ثقل الدم و/أو قياس كمية الكرياتينين في المحل.

قبل البدء باستعمال المستحضر على المريض إجراء تقييم قلبي وعائي يشمل فحص تخطيط صدى القلب. إضافة لذلك من الموصى به قبل بدء العلاج إجراء فحص الثدي، فحص الأداء الوظيفي للرئتين/صورة للصدر بأشعة رنتجن ووظائف الكليتين. لا يجوز إستعمال هذا المستحضر إذا شخصت إصابة في صمامات القلب.

في حالة فرط البرولاكتين في الدم، يجب إجراء فحص للعددة الخناقية قبل البدء بالعلاج. من الموصى به مراقبة ضغط الدم، خاصة في الأيام الأولى للعلاج.

أثناء سير العلاج بالمستحضر يجب مراجعة الطبيب حالاً عندما تشعر/ين بالعلامات التالية: صعوبة في التنفس، ضيق التنفس، سعال متواصل و/أو آلام في الصدر، آلام وإنتفاخ في منطقة الخاصرتين و/أو فشل قلبي.

يوصى بإجراء المتابعة والمراقبة الدورية وذلك لتشخيص تطور الإنتفاخات، نتدب و/أو إصابة في صمامات القلب. كما من المطلوب إجراء الفحص الأول لتخطيط صدى القلب بعد مرور ٣ - ٦ أشهر علاجية ثم تكراره كل ٦ - ١٢ شهراً. في حالة إكتشاف إصابة أو تفاقم من حالة صمامات القلب من المطلوب إيقاف العلاج بالمستحضر.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

ينتمي الدواء إلى فصيلة الأدوية التي قد تؤدي إلى حدوث ظاهرة القمار المرضى، زيادة الشهوة الجنسية (ليبيدو) والإفراط في الجنس. تختفي هذه الأعراض عادة عند تخفيض الجرعة أو عند تغيير العلاج من قبل الطبيب.

أما هينر رغيשה/ لمزوم كلשהو أو לתרופה כלשהו, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

התכשיר מוסיף לקבוצת תרופות העלולות לגרום לתופעות של הימורים חולניים, עלייה ביצר המיני (ליבידו) ועודף מיניות. תופעות אלו חולפות בדרך-כלל עם הורדת המינון או שינוי הטיפול על-ידי הרופא.

**תגובות בין-תרופתיות:**

אם הينر נוטל/ת תרופה נוספת, לרבות תרופות ללא מרשם או תוספי תזונה, או אם גمرت זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד הקאות, אנטיביוטיקה מקבוצת המקרוליידים (אריתרומיצין), תרופות אחרות מקבוצת הארגוט-אלקלואידים, פנותאינים ובوتירופנונים (למחלות נפשיות), מטוקולופראמיד (להקאות), תיזוקסנטניים, ותרופות להורדת לחץ דם.

**תופעות לוואי:**

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: הפרעות עיכול, עצירות, בחילה/הקאות, נמנום, הרגשת גלי חום, סחרחורת, עייפות, כאבי בטן, כאב/רגישות בשידים, דופק מהיר (נדיר), דימום מהאף (נדיר), ישנוניות, נשירת שיער, אקנה.

**תופעות לוואי המהיבות התייחסות מיוחדת:**

דיכאון, בלבול, חזות, הידממות/אמנויה, חולשה, בצקות, התכווציות שרירי הרגליים, הפרעות בראייה (נדיר) - המשך/י בטיפול ופנה/י לרופא מיד.

השפעה פסיכוטית (כגון רצון להמר, עלייה בליבידו, עודף מיניות), תוקפנות - פנה/י לרופא מיד!

שינויים בתוצאות בדיקת דם ו/או תפקודי כבד (עלייה בפעילות האמינים) - המשך/י בטיפול ופנה/י לרופא מיד.

תופעות העשויות להעיד על פיברוזיס (התעבות והצטלקות) ברקמות הלב, הריאה ו/או חלל הבטן האחורי כגון: עלפון, כאב בחזה/צלעות/במותניים/בגב/באגן, הפרעות בתנועה, נפיחות ברגליים, לחץ דם נמוך, קוצר נשימה, קשיי נשימה, שינויים בקצב הלב/דפיקות לב - הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!

תגובה אלרגית המתבטאת בפריחה עורית, גרד, שלפוחיות בעור, נפיחות בפנים, בלשון, בוצאר ו/או בגפיים, קוצר נשימה, החמרה של אסתמה, הלם (שוק) - הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד!

בלב מקרה שבו הينר מרגישה/ת תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון:**

מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.

**תרופה זו אינה מיועדת בדרך-כלל לנערים/ות מתחת לגיל 16 שנים.**

**אופן השימוש:**

ניתן לחצות או לרסק את הטבליה.

יש לבלוע את התרופה עם מים. יש ליטול את התרופה עם הארוחה.

**א כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?**

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב הבריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

**מנע/י הרעלה** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריות התרופה איתך.

אין לברוא להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא או תרופה זו נרשמה לטיפול במחלת, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק, אל תיתנ/י תרופה זו לקרוביך, שכנר או מכר/י.

**אין ליטול תרופות בחושר/י** יש לברוק את התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. אין להרכיב במקשים אם הينר זקוק/ה להם.

**אחסנה:** במקום קריר יבש וחשוך, מתחת ל- 25°C.

גם לפי נתאי האריות/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוק שטיפיק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' יישום התרופה:** 00 31180 135 73

**פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי**



101018010



182

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
(תכשירים) התשמ"ו - 1986

## קבותרים 0.5 מ"ג

### טבליות

תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

הרכב:

כל טבליה מכילה:

Cabergoline 0.5 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, citric acid (anhydrous), magnesium stearate

**קבוצה תרופתית:**

אגוניסט לרצפטור דופמין.

**פעילות רפואית:**

מעכב ומדכא יצירת פרולקטין. לעיכוב והפסקה של יצירת חלב ולטיפול בבעיות של היפרפרולקטינימה.

**מתי אין להשתמש בתרופה?**

אל תשתמש בתרופה כאשר הينר בהריון או מיניקה (אלא אם התרופה מועדת להפסקת הנקה).

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לאלקלואידים ממשפחת הארגוט (Ergot).

אין להשתמש אם הينר סובל/ת מיתר לחץ דם לא מבוקר.

אין להשתמש בתכשיר באנשים הסובלים מהיסטוריה של ליפית (Fibrosis) של הריאות, מסב הלב (Pericardium) ו/או של חלל הבטן האחורי (Retroperitoneum).

אין להשתמש בתכשיר באנשים הסובלים מפגיעה מבנית במסתמי הלב.

**אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול במקרים הבאים:**

אם הينר סובל/ת או סבל/ת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה), הלב ו/או כלי דם, הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון אולקוס), סינדרום ריינאוד (Raynaud's syndrome), היסטוריה של הפרעות נפשיות או פסיכוטיות, או בחולים המטופלים בתרופות אנטי פסיכוטיות.

**אין תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?**

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ויף עלול לגרום להירדמות פתאומית ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות.

**אזהרות:**

לפני השימוש בתרופה, ואם המחזור מאחר מעל 3 ימים, יש לערוך בדיקות לשלילת הריון. בעת השימוש בתרופה, יש להשתמש באמצעים לא הורמונליים למניעת הריון. במקרה של הריון, יש להפסיק מיד את נטילת התרופה. יש למנוע הריון לפחות חודש מתום השימוש בתרופה.

מקרים מסוימים טיפול ממושך בקברגולין עלול לגרום לפיברוזיס ומצבים מסוימים של הריאות. קרום הלב וחלל הבטן האחורי וכן לפגיעה במסתמי הלב. במקרים מסוימים עם הפסקת הטיפול בקברגולין ישנה הטבה במצב מסתמי הלב.

למטופלים הנוטלים קברגולין וחשים הפרעות או קשיי נשימה מומלץ לפנות לרופא כדי שישקול לבצע צילום רנטגן של בית החזה, שקיעת דם ו/או מדידת כמות קריאטינין בסרום. לפני התחלת הטיפול בתכשיר של המטופל לעבור הערכה קרדיו-וסקולרית, כולל בדיקת תהודה של הלב (Echocardiogram). מומלץ בנוסף לערוך טרם תחילת הטיפול שקיעת דם, בדיקת תפקוד ריאות/צילום רנטגן של בית החזה ותפקוד כליתי. אין להשתמש בתכשיר זה מטופלים הנוטלים חומרים חומרים במסתמי הלב.

במקרה של היפרפרולקטינימה, יש לבצע בדיקה של בלוטת יותרת המוח לפני תחילת הטיפול. מומלץ לוטר את לחצי הדם, בעיקר בימים הראשונים לטיפול.

במהלך הטיפול בתכשיר יש לפנות מיד לרופא באם הينר חשה/ה בסימנים הבאים: קשיי נשימה, קוצר נשימה, שיעול ממושך, ו/או כאבים בחזה, כאבים ונפיחות באזור המותניים ו/או כשל לבי. מומלץ לבצע ניטור תלופתי לאבחון התפתחות של הידבקות, הצטלקות ו/או פגיעה במסתמי הלב.

בדיקת התהודה של הלב הראשונה נדרשת להתבצע לאחר 3-6 חודשי טיפול ויש לחזור עליה כל 6-12 חודשים. במידה ונמצאה פגיעה או החמרה במצב מסתמי הלב נדרש להפסיק את הטיפול בתכשיר.



PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH  
THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

## CABOTRIM 0.5 mg Tablets

The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine

### Composition:

Each tablet contains:  
Cabergoline 0.5 mg

### Inactive ingredients:

Microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, citric acid (anhydrous), magnesium stearate

### Therapeutic group:

Dopamine receptor agonist.

### Therapeutic activity:

Inhibits and suppresses production of prolactin. Used for inhibition and suppression of lactation and treatment of hyperprolactinemia disorders.

### When should the preparation not be used?

Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding (unless the medicine is intended for cessation of lactation).

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients or to ergot alkaloids.

Do not use this medicine if you suffer from uncontrolled hypertension.

Do not use this medicine in people with a history of pulmonary, pericardial and/or retroperitoneal fibrosis.

Do not use this medicine in people who suffer from structural damage of the cardiac valves.

### Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment in the following cases:

If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired function of: the respiratory system (e.g. asthma), the heart and/or vascular system, the liver, the kidney/urinary tract, the digestive system (e.g. ulcer), from Raynaud's syndrome, if you have a history of mental or psychotic disorders, or in patients treated with antipsychotic medicines.

### How will this medicine affect your daily life?

Use of this medicine may impair alertness and even cause sudden onset of sleep; therefore caution should be exercised when driving a car, operating dangerous machinery and in any activity which requires alertness.

### Warnings:

Before using this medicine, and if the period is more than 3 days late, tests to rule out pregnancy should be performed. Non-hormonal contraception should be used during treatment with this medicine. In case of pregnancy, stop taking this medicine immediately. Pregnancy should be avoided for at least 1 month following cessation of the treatment. In certain cases prolonged treatment with cabergoline may cause fibrosis and inflammatory conditions in the lungs, pericardium and retroperitoneum as well as cardiac valve damage. In some cases the cardiac valve condition improves upon discontinuation of treatment with cabergoline.

It is recommended that patients taking cabergoline, who experience breathing disturbances or difficulty breathing, refer to their doctor who will consider whether to perform a chest X-ray, blood sedimentation rate and/or serum creatinine measurements.

Before initiating treatment with this medicine the patient should undergo a cardiovascular evaluation, including an echocardiogram. It is also recommended to perform blood sedimentation rate test, lung function test/chest X-ray and renal function tests prior to initiation of therapy. If cardiac valve damage is diagnosed, the preparation should not be used.

In case of hyperprolactinemia, a pituitary gland test should be performed before starting treatment. It is recommended to monitor your blood pressure especially in the first days of treatment.

During treatment with this medicine refer to your doctor immediately if you experience the following symptoms: difficulty breathing, shortness of breath, persistent cough and/or chest pain, pain and swelling in the waist area, and/or cardiac failure. Periodic diagnostic monitoring for development of adhesion, scarring and/or damage of the cardiac valves is recommended. The first echocardiogram should be performed after 3-6 months of treatment and should be repeated every 6-12 months. If damage or worsening of the condition of the heart valves is found, treatment with the preparation should be discontinued.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine.

This medicine belongs to a group of preparations which might cause pathological gambling, increased libido and hypersexuality. These effects generally subside upon reduction of the dose or treatment modification by the doctor.

### Drug interactions:

If you are taking another drug concomitantly, including non-prescription medicines or food supplements, or if you have just finished treatment with another medicine, inform your doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially important for medicines belonging to the following groups: antiemetics, macrolide antibiotics (erythromycin), other ergot-alkaloids, phenothiazines and butyrophenones (for mental illness), metoclopramide (antiemetic), thioxanthenes, and medicines for lowering blood pressure.

### Side effects:

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine, for example: digestive disturbances, constipation, nausea/vomiting, drowsiness, feverish feeling/hot flashes, dizziness, tiredness, abdominal pain, breast tenderness/pain, fast pulse (rare), nose bleeds (rare), somnolence, hair loss, acne.

### Side effects that require special attention:

Depression, confusion, hallucinations, sudden onset of sleep, weakness, edemas, leg muscle cramps, vision disturbances (rare) - continue treatment and refer to the doctor immediately.

Psychotic effect (e.g. a desire to gamble, increased libido, hypersexuality), aggressiveness - refer to the doctor immediately!

Changes in the results of blood tests and/or liver function (increased enzyme activity) - continue treatment and refer to the doctor immediately.

Effects that may indicate fibrosis (thickening and scarring) of the heart, lung and/or retroperitoneal tissues, e.g.: fainting, chest/ribs/waist/back/pelvic pain, movement disorders, swollen legs, low blood pressure, shortness of breath, difficulty breathing, changes in heart rate/palpitations - discontinue treatment and refer to the doctor immediately!

Allergic reaction manifested by skin rash, itching, skin blisters, swelling of the face, tongue, neck and/or extremities, shortness of breath, exacerbation of asthma, shock - discontinue treatment and refer to the doctor immediately!

In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

### Dosage:

Dosage is according to doctor's instructions only. Do not exceed the recommended dosage. This medicine is not usually intended for adolescents under 16 years of age.

### Directions for use:

The tablet may be halved or crushed.

Swallow the medicine with water. Take the medicine with a meal.

### How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed by the doctor.

Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine without consulting your doctor.

**Avoid poisoning!** This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor! This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm.

Do not give this medicine to your relatives, neighbours or acquaintances.

Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

**Storage:** Store in a cool dry and dark place, below 25°C. Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.

License number: 135 73 31180 00

The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked and approved by it

Maabarot 40230  
Israel Pharmaceutical Products  
Maabarot Ltd.

101018010

### التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية أو إضافات غذائية، أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأضرار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصةً الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: مضادات التقيؤ، المضادات الحيوية من فصيلة الماكروليديات (إريثروميسين)، أدوية أخرى من فصيلة قلويدات الإبرغوت، فينوتيازينات و بوتيروفينونات (للأمراض النفسية)، ميتوكلوبراميد (للتقيؤات)، تيوكسانثينات، وأدوية لتخفيض ضغط الدم.

### الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل: إضطراب نفسي، إرتباك، هذيان، نعاس، الشعور/هبات من الحر، دوار، إرهاق، آلام في البطن، ألم/حساسية في الثديين، نبض سريع (نادراً)، رعاف (نادراً)، الميل إلى النوم، تساقط الشعر، حب الشباب.

### الأعراض الجانبية التي إنتهت إهتماماً خاصاً:

الرؤية (نادراً) - استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً.

تأثير ذهاني (كالرغبة في القمار، زيادة الشهوة الجنسية - ليبيدو، الإفراط في الجنس)، عدوانية - راجع/ي الطبيب حالاً!

تغيرات في نتائج فحص الدم و/أو وظائف الكبد (زيادة نشاط الخمائر) - استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً.

أعراض يمكن أن تدل على حدوث تليف (سماكة وتندب) في أنسجة القلب، الرئة و/أو الجوف الخلفي للبطن مثل: إغماء، ألم في الصدر/في الأضلاع/في الخافصة/في الظهر/في الحوض، إضطرابات في الحركة، إنتفاخ في الرجلين، ضغط دم منخفض، ضيق في التنفس، صعوبات في التنفس، تغيرات في نظم القلب/خفقان القلب - توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً!

رد فعل تحسسي يتمثل بطغق جلدي، حكة، حوصصات في الجلد، إنتفاخ في الوجه، في اللسان، في العنق و/أو في الأطراف، ضيق في التنفس، تاقام الربو، صدمة - توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً!

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

### الجرعة الدوائية:

يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص عادة للفتيات دون ١٦ سنة من العمر.

### إرشادات الإستعمال:

بالإمكان شطر القرص إلى نصفين أو سحقه.

يجب إتلاع الدواء مع الماء.

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.

### كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

يجب إتباع التعليمات الموصى به من قبل الطبيب.

لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

### تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء و/أو مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمرضى آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقرابك، جيرارك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء، ضع/ي الإحتياطات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد جاف ومظلم، دون ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن.

الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة، في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٣٥ ٧٣ ٣١١٨٠ ٠٠

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها وأُخضت من قبيلها

تريما TRIMA

معبروت ٤٠٢٣٠  
الصناعات الإسرائيلية للأدوية  
معبروت، م.ض.

